

Arbusto pelado con la cáscara blanquecina, verrugosa. Ramas pocas, hacia el ápice de los troncos. Hojas en número de 6-8 amontonadas hacia el extremo de las ramas; herbáceas, de contorno aovado, profundamente pinatisectas con los segmentos irregularmente recortados; los segmentos ínfimos mas pequeños; largo total hasta 20 cm. de los que el pecíolo ocupa 2-3 cm.; de 7-5 cm. de ancho. Inflorescencia dicótomo-paniculada, hojosa en los puntos de ramificación; las ramitas casi horizontales. Cabezuelas numerosas, pequeñas, en número de 5-10 aglomeradas en el extremo de las ramitas. Invólucro acampañado-cilíndrico, de 5 mm. de largo; sus hojuelas obtusas. Brácteas del receptáculo c a. 6. Flores 12-18, de 7 mm. de largo. Lígulas cortas. Pelos del vilano ca. 10. Aquenios desconocidos. Troncos de 1 m. de alto i en la base de 5 cm. de grueso.

En la Isla de San Félix 26° 16' l. m. 80° l. occ.)

Clave de las *Ligulifloras-Cichórinas*

- I. Corolas celestes (rara vez blancas o rosadas)..... 118. *Cichorium*
- II. Corolas amarillas
 - A. Vilano ninguno..... 119. *Lapsana*
 - B. El vilano existe.
 - 1. Los aquenios interiores con vilano doble..... 120. *Hedypnois*
 - 2. Vilano sencillo..... 121. *Microseris*

118. *Cichorium*.—L.

Cabezuela homógama, liguliflora. Invólucro de 2 filas de hojuelas de las que las exteriores son cortas, las interiores mas largas, lineares, con la base cóncava. Receptáculo desnudo o fibriloso. Lígulas troncadas. Anteras con el ápice alado i la base afechada. Ramitas del estilo delgadas, obtusas. Aquenios prismáticos, atenuados en la base; los exteriores comprimidos

desde el dorso; con el ápice truncado i coronado por el vilano de escamitas cortas.—Hierbas perennes, estendido-ramosas. Hojas inferiores en roseta; las tallinas pocas. Cabezuelas sésiles o pedunculadas a lo largo de las ramas. Corolas celestes.—Ca. 7-8 especies de la rejion mediterránea de Europa (hasta la Abesinia) de las que una se hizo maleza comun en una gran estension del globo.

I. C. INTYBUS L. Sp. Pl. 813.—Gay III páj. 432. "Achicoria"
 Planta perenne, áspero-peluda. Hojas radicales runcinadas con los segmentos distantes, agudos. Tallos ríjidos, duros, vestidos de hojas ralas, oblongas, enteras; las de la rejion floral lanceoladas, abrazadoras. Cabezuelas en número de 2-3 sésiles en las axilas de las hojas superiores. Aquenios blanquecinos, con el pericarpio áspero, de 2,5-3 mm. de largo. Escamitas del vilano numerosas. Tallos 0,6-0,8 m.

Maleza comun de las provincias centrales hasta Valdivia. Diciembre a Febrero.

Observacion. C. *Endivia* L., la endivia, es planta de cultivo.

119. *Lapsana*.—L.

Cabezuela homógama, liguliflora. Invólucro cilíndrico-acampanado, de 2 filas de hojuelas; las exteriores mui cortas, las interiores uniseriadas, mas largas. Receptáculo plano, desnudo. Lígulas truncadas. Anteras con el ápice alado i la base aflechada. Ramitas del estilo delgadas. Aquenios trasovoídeo-oblongos, recorridos por muchas costillas mui juntas; pelados, con el ápice obtuso, sin vilano.—Hierbas anuales, ramosas, casi peladas. Cabezuelas pequeñas, paniculadas. Corolas amarillas.—Ca. 9 especies de Europa i Asia; una de ellas en América cómo maleza.

I. L. COMMUNIS. L. Sp. Pl. 811.

Planta con las hojas radicales en roseta. Tallo paniculado-ramoso. Las hojas tallinas oblongas, dentadas, pecioladas. Flores 8-17. Corolas poco mas largas que el invólucro. Aquenios